

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa - właściwe narzędzie do oceny rozwoju funkcjonalnego dzieci.

Aneta Suder¹, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński,

Wstęp

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR) to wykorzystywana na całym świecie, ugruntowana metoda wczesnej diagnostyki stosowana do wieloaspektowej oceny rozwoju psychoruchowego dzieci. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR) jest metodą diagnostyczną opracowaną w Monachium przez pediatrę Theodora Hellbrugge, opierającą się na obserwacji, analizie i interpretacji zachowania dziecka. Metodę tę stosuje się do oceny rozwoju dziecka w wieku od pierwszego miesiąca życia do sześciu lat. MFDR obejmuje diagnostykę bazową, która ujmuje opóźnienia w sposób ilościowy w 8 obszarach (dużej motoryki, małej motoryki, percepcji, mówienia, rozumienia mowy, wieku społecznego, samodzielności). Diagnostyka monachijska jest podstawą do podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych.

Cel pracy

Przedstawienie Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej jako właściwe narzędzie do oceny rozwoju funkcjonalnego dzieci od urodzenia do 6 roku życia.

Materiał i metody

Przegląd polskiego i zagranicznego piśmiennictwa pod kątem wykorzystania Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej w diagnostyce rozwojowej dzieci.

MFDR dla 1. roku życia ocenia:

- wiek rączkowania;
- Wiek siadania;
- Wiek chodzenia;
- Wiek chwytania;
- Wiek percepcji;
- Wiek mówienia;
- Wiek rozumienia mowy;
- Wiek rozwoju społecznego.


MFDR dla 2 i 3. roku życia obejmuje diagnostykę:

- Wiek chodzenia;
- Wiek sprawności manualnej;
- Wiek percepcji;
- Wiek mówienia;
- Wiek rozumienia mowy;
- Wiek społecznego;
- W zakresie samodzielności,

MFDR dla 4-6 roku życia obejmuje ocenę:

- Motoryki precyzyjnej;
- Inteligencji wzrokowej;
- Mowy i wiedzy ogólnej;
- Rozumienia liczb;
- Samodzielności;
- Logicznego myślenia.

Do przeprowadzenia badania przy pomocy „Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej” wykorzystywany jest standaryzowany materiał.



W Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyce Rozwojowej świadomie rezygnuje się z obliczenia globalnego wieku rozwoju czy też ilorazu rozwoju. „Profil rozwojowy” przedstawia graficznie stan rozwoju dziecka we wszystkich dziedzinach i zwraca uwagę na szczególnie duże odchylenia.

Wnioski: Monachijska Funkcjonalnej Diagnostyka Rozwojowa jest kompleksową oceną rozwoju psychoruchowego dziecka, dzięki której możliwe jest wczesne wykrywanie ewentualnych zaburzeń funkcjonalnych.

Wybrane piśmiennictwo:

Theodor Hellbrugge Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 2 i 3 rok życia, Wrocław 2016.

Theodor Hellbrugge Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 1 rok życia, Wrocław 2016.

Markiewicz K., Pachalska M., Diagnosis of severe developmental disorders in children under three years of age, Medical Science Monitor, 2007, 13 (2) , CR89-CR99.

Gajewska E., Sobieska M., Samborski W., Correlates between Munich Functional Developmental Diagnostics and postural reactivity findings based on seven provoked postural reactions modus Vojta during the first period of child's life, Annales Academiae Medicae Stetinensis, 2006, 52(3):67-70.

Choińska A. M., Sadowska L., Bartosik B., Rozwój psychoruchowy u dzieci z zespołem Downa usprawnianych od urodzenia z uwzględnieniem wzorców postawy i lokomocji, Post. Rehabil. 2002; 16 (4):43-64.

Całość piśmiennictwa dostępna u autora.